

## 研究スケジュール

### 初期治療

期間：登録前 30～120 日間の間


治療：

1～3 回のラニビズマブ

1～2 回の PDT

1～3 回のペガブタニブ・ナトリウム


又は、～ の適切な組み合わせのいずれかの治療を受けること。



維持療法開始前に同意取得

### 維持療法

治療：ペガブタニブ・ナトリウム 0.3mg/眼を 6 週間毎に 48 週間硝子体内注射する。



### 評価

6 週間ごとに検査を行い、有害事象等を収集する。

診療/週	ベースライン <sup>1</sup>	0 日目		6 週目		12 週目	
	スクリーニング日	注射前	注射後	注射前	注射後	注視前	注射後
インフォームドコンセント	X <sup>2</sup>						
既往歴, 眼病歴	X						
視力検査	B	S <sup>4</sup>		S		S	
眼圧測定 <sup>3</sup> /眼科検査	B	S <sup>4</sup>	S <sup>5</sup>	S	<u>S</u>	S	<u>S</u>
カラー眼底撮影/蛍光眼底造影	B						
OCT	S			S		S	
血圧測定	X	X <sup>4</sup>					
ペガブタニブ・ナトリウム 注射		X		X		X	
併用薬	←						→
有害事象 <sup>6</sup>			←				→

